Quelques conseils pour les médicaments que vous prenez chez vous:

Le traitement du patient dialysé ne se résume pas seulement à la dialyse. Bon nombre des médicaments que vous devez prendre lorsque vous commencez la dialyse sont les mêmes que ceux que vous preniez auparavant. Certaines prescriptions devront être adaptées par le néphrologue.

La prise quotidienne et correcte de ces médicaments permet un traitement efficace et une meilleure qualité de vie.

Suivez fidèlement les traitements recommandés par votre médecin et ne faites pas d'automédication y compris avec les produits à base de plantes.

Informez toujours les médecins et les pharmaciens que vous souffrez d'insuffisance rénale et que vous êtes dialysé.

Informez les infirmières du service de toutes les modifications de traitement habituel pour qu'elles puissent en faire part au néphrologue et pensez à ramener toutes les ordonnances.

Durant la séance de dialyse ne prenez aucun autre médicament que ceux délivrés par la pharmacie de l'ASA (pour éviter l'interruption de certains traitements, le néphrologue pourra valider de façon exceptionnelle et transitoire la prise d'autres médicaments ; ils seront enregistrés dans votre dossier).



La règle des 5B:

Ces médicaments sont prescrits et administrés selon la règle des 5B: le bon médicament, à la bonne dose, selon la bonne voie d'administration, au bon patient et au bon moment.

Service Pharmacie

Dr Murielle Pairin, Pharmacien Gérant

Dr Isabelle Jager Pharmacien Adjoint

@: pui@asadialyse57.fr

2: 03.55.00.15.40



Mes médicaments en dialyse



Les médicaments couramment administrés pendant la séance d'hémodialyse sont :

Les anticoagulants (Lovenox®...)

Ils sont administrés pour éviter la formation de caillots sanguins dans le circuit et dans le dialyseur durant la séance.

Les traitements de l'anémie

Les Agents stimulants de l'érythropoïèse ASE (Aranesp® ou Mircera®....)

Les reins produisent de l'EPO, hormone qui stimule la production de globules rouges. En cas d'insuffisance rénale, cette hormone est souvent insuffisante, ce qui entraîne une production trop faible de globules rouges, conduisant à une anémie. Les ASE administrés remplacent l'EPO.

Le fer injectable (Venofer® ou Ferinject®....)

Le fer est indispensable à la production des globules rouges. La supplémentation en fer injectable est parfois nécessaire.



Les traitements de l'hyperparathyroïdie

La vitamine D3 (Un Alfa®...)

Les calcimimétiques (Parsabiv®...)

L'hyperparathyroïdie secondaire est fréquente chez les patients dialysés. Les taux élevés de parathormone (PTH) qui la caractérisent sont secondaires à l'hypocalcémie, au déficit en vitamine D et à l'hyperphosphorémie.

Les vaccins

Contre l'hépatite B (Engerix®...)

Contre les Pneumocoques (Prévenar®, Pneuvomax®...)

Contre le Coronavirus (Comirnaty® ...)

Les patients dialysés sont plus sensibles aux maladies infectieuses. Il est donc important de les vacciner et de renouveler les administrations plus fréquemment que dans la population générale afin de prévenir les infections.

Les antibiotiques

Les antibiotiques sont prescrits pour la prévention ou le traitement d'infections.

Chez les personnes atteintes d'une insuffisance rénale sévère, une adaptation du dosage est souvent nécessaire.

Les autres médicaments

Il peut s'agir de médicaments pour soulager la douleur, les démangeaisons, corriger l'hypoglycémie, l'hypertension etc...

Attention aux allergies!



Signalez aux équipes soignantes les allergies dont vous avez connaissance, et si vous ressentez des démangeaisons, des difficultés à respirer...lors de l'administration des médicaments, appelez immédiatement l'infirmier (ère)!